

La matematica nei puzzle infiniti

Maurizio Paolini (paolini@dmf.unicatt.it)

Università Cattolica di Brescia

Firenze, ottobre 2013

- Riempiamo il piano in modo “facile” (periodico)
- I 17 “wallpaper groups”
- Riempiamo il piano in modo “strano” (aperiodico)
- Animazione **Frecce e aquiloni**, (M. Paolini e A. Musesti, Univ. Catt.)
- Deflazione - Inflazione
- Ruota di carro, batman, asterix e i decapodi
- Bibliografia

La torta del convegno

Iniziamo con un giochino di una vecchia gara di matematica:
I sei organizzatori del convegno vogliono festeggiare con una torta:



come possono dividerla i sei partiti uguali (congruenti)?

La torta del convegno


Iniziamo con un giochino di una vecchia gara di matematica:
I sei organizzatori del convegno vogliono festeggiare con una torta:



come possono dividerla i sei parti uguali (congruenti)?
Lasciamo in sospeso, potete pensarci un pochino, magari ci torniamo su tra un po'

Una piastrella fatta a caso


Un tizio un po' strano ha comprato tante piastrelle come questa:



e vuole usarle per pavimentare il suo salotto. Come può fare?

Una piastrella fatta a caso

Un tizio un po' strano ha comprato tante piastrelle come questa:






e vuole usarle per pavimentare il suo salotto. Come può fare?
Ovviamente non ci riesce!

Piastrelle più normali...

Se avesse (più saggiamente) comprato piastrelle quadrate, oppure esagonali, oppure triangolari, sarebbe stato più semplice:




Piastrelle più normali...

Se avesse (più saggiamente) comprato piastrelle quadrate, oppure esagonali, oppure triangolari, sarebbe stato più semplice:



Piastrelle più normali...




Se avesse (più saggiamente) comprato piastrelle quadrate, oppure esagonali, oppure triangolari, sarebbe stato più semplice:



Secondo voi si possono usare altri poligoni regolari, come il pentagono o l'ottagono?

Piastrelle più normali...

Se avesse (più saggiamente) comprato piastrelle quadrate, oppure esagonali, oppure triangolari, sarebbe stato più semplice:



Secondo voi si possono usare altri poligoni regolari, come il pentagono o l'ottagono?

Perché no?

Piastrelle più normali (2)

Usando altre forme ci si può sbizzarrire, ad esempio con rettangoli 2×1 :

Piastrelle più normali (2)

Usando altre forme ci si può sbizzarrire, ad esempio con rettangoli 2×1 :



Piastrelle più normali (2)

Usando altre forme ci si può sbizzarrire, ad esempio con rettangoli 2×1 :



Piastrelle più normali (2)

Usando altre forme ci si può sbizzarrire, ad esempio con rettangoli 2×1 :



Piastrelle più normali (2)


Usando altre forme ci si può sbizzarrire, ad esempio con rettangoli 2x1:



e si possono immaginare molte altre configurazioni, provate a chiedere ad un piastellista...

Piastrelle più normali (3)



Si può usare un ottagono?



No! però...

Piastrelle più normali (3)

Si può usare un ottagono?



No! però...
se aggiungo un quadrato la situazione cambia.

Altre forme (1)


Ecco una forma un po' strana:



Qualcosa si può fare immaginando di incastrare la punta di un "cuore" nell'incavo di un altro "cuore" ...

Altre forme (1)

Ecco una forma un po' strana:




Qualcosina si può fare immaginando di incastrare la punta di un
“cuore” nell’incavo di un altro “cuore” ...

Sorpresa!

Altre forme (1)

Ecco una forma un po' strana:



Qualcosa si può fare immaginando di incastrare la punta di un
“cuore” nell’incavo di un altro “cuore” ...

Sorpresa!

Ma purtroppo non si può riempire tutto il piano.

Personaggi (1)

同じ図柄を紙の上に繰り返していくときの抑えがたい喜びに
ただ夢中になっていたのです。

I was simply driven by the irresistible pleasure I felt
in repeating the same figures on a piece of paper.

M.C. Escher 1964

“Ero trascinato dal piacere irresistibile che sentivo
nel ripetere le stesse figure su un pezzo di carta”

M.C. Escher 1964

Personaggi (1)

同じ図柄を紙の上に繰り返していくときの抑えがたい喜びに
ただ夢中になっていたのです。

I was simply driven by the irresistible pleasure I felt
in repeating the same figures on a piece of paper.

M.C. Escher 1964

"Ero trascinato dal piacere irresistibile che sentivo
nel ripetere le stesse figure su un pezzo di carta"

M.C. Escher 1964



Maurits Cornelis Escher

1898–1972, artista olandese famoso per le
sue litografie con figure combacianti
riconoscibili

Personaggi (1)

同じ図柄を紙の上に繰り返していくときの抑えがたい喜びに
ただ夢中になっていたのです。

I was simply driven by the irresistible pleasure I felt
in repeating the same figures on a piece of paper.

M.C. Escher 1964


"Ero trascinato dal piacere irresistibile che sentivo
nel ripetere le stesse figure su un pezzo di carta"

M.C. Escher 1964



Maurits Cornelis Escher

1898–1972, artista olandese famoso per le sue litografie con figure combacianti riconoscibili



Uno dei temi ricorrenti nelle sue opere è quello dei riempimenti periodici del piano.

I “wallpaper groups”

Nei disegni di Escher la forma dei tasselli (in genere animali reali o fantastici) è accuratamente studiata in modo da permettere una perfetta corrispondenza come per le tessere di un puzzle.

La matematica (in particolare la teoria dei gruppi) permette di classificare le diverse possibili tassellazioni periodiche dal punto di vista della loro struttura.

Ci sono esattamente 17 possibilità! Le sigle $p2$, $p3$, pgg , ... corrispondono alla terminologia introdotta dai cristallografi, la più comune.

Conway ha proposto una classificazione alternativa:

Conway	o	xx	*x	**	632	*632
Cristallogr.	p1	pg	cm	pm	p6	p6m
Conway	333	*333	3*3	442	*442	4*2
Cristallogr.	p3	p3m1	p31m	p4	p4m	p4g
Conway	2222	22x	22*	*2222	2*22	
Cristallogr.	p2	pgg	pmg	pmm	cmm	

I “wallpaper groups”

Nei disegni di Escher la forma dei tasselli (in genere animali reali o fantastici) è accuratamente studiata in modo da permettere una perfetta corrispondenza come per le tessere di un puzzle.

La matematica (in particolare la teoria dei gruppi) permette di classificare le diverse possibili tassellazioni periodiche dal punto di vista della loro struttura.

Ci sono esattamente **17** possibilità! Le sigle $p2$, $p3$, pgg , ... corrispondono alla terminologia introdotta dai cristallografi, la più comune.

Conway ha proposto una classificazione alternativa:

Conway	o	xx	*x	**	632	*632
Cristallogr.	p1	pg	cm	pm	p6	p6m
Conway	333	*333	3*3	442	*442	4*2
Cristallogr.	p3	p3m1	p31m	p4	p4m	p4g
Conway	2222	22x	22*	*2222	2*22	
Cristallogr.	p2	pgg	pmg	pmm	cmm	

I “wallpaper groups”

Nei disegni di Escher la forma dei tasselli (in genere animali reali o fantastici) è accuratamente studiata in modo da permettere una perfetta corrispondenza come per le tessere di un puzzle.


La matematica (in particolare la teoria dei gruppi) permette di classificare le diverse possibili tassellazioni periodiche dal punto di vista della loro struttura.

Ci sono esattamente **17** possibilità! Le sigle $p2$, $p3$, pgg , ... corrispondono alla terminologia introdotta dai cristallografi, la più comune.

Conway ha proposto una classificazione alternativa:

Conway	o	xx	*x	**	632	*632
Cristallogr.	p1	pg	cm	pm	p6	p6m
Conway	333	*333	3*3	442	*442	4*2
Cristallogr.	p3	p3m1	p31m	p4	p4m	p4g
Conway	2222	22x	22*	*2222	2*22	
Cristallogr.	p2	pgg	pmg	pmm	cmm	

Riconoscere il gruppo giusto



Animazione Rep-Tiles (Roberto Giunti)



Le sette animazioni messe a punto da Roberto Giunti (Liceo Scientifico Copernico - Brescia, www.robertogiunti.it) illustrano rispettivamente sette disegni di M.C. Escher, corrispondenti a 6 dei 17 gruppi di simmetria della “carta da parati”.

Rep-Tile = reptiles + tiles




Animazione Rep-Tiles (Roberto Giunti)

Le sette animazioni messe a punto da Roberto Giunti (Liceo Scientifico Copernico - Brescia, www.robertogiunti.it) illustrano rispettivamente sette disegni di M.C. Escher, corrispondenti a 6 dei 17 gruppi di simmetria della “carta da parati”.

Rep-Tile = reptiles + tiles



p2
p3
p4



p6
pgg
pg

Le tassellazioni di Penrose

È facile costruire tassellazioni non periodiche...

Cosa significa invece “**Tassellazione aperiodica**”?

È facile costruire tassellazioni non periodiche...

Cosa significa invece “**Tassellazione aperiodica**”?

Tassellazione aperiodica

È un insieme di tasselli (prototasselli) tali che:

- ❶ Con essi è possibile tassellare il piano...
- ❷ Non è possibile farlo in modo periodico!

È facile costruire tassellazioni non periodiche...




Cosa significa invece “**Tassellazione aperiodica**”?

Tassellazione aperiodica


È un insieme di tasselli (prototasselli) tali che:

- ① Con essi è possibile tassellare il piano...
- ② Non è possibile farlo in modo periodico!

Le più famose sono quelle proposte da Roger Penrose




Personaggi (2, 3, 4)



Sir Roger Penrose (1931-)

Fisico e matematico inglese. Contributi nel campo della relatività generale (cosmologia e buchi neri, con Stephen Hawking); filosofo; giochi matematici.

Personaggi (2, 3, 4)



Sir Roger Penrose (1931-)


Fisico e matematico inglese. Contributi nel campo della relatività generale (cosmologia e buchi neri, con Stephen Hawking); filosofo; giochi matematici.

John Horton Conway (1937-)

Geniale matematico inglese. Contributi fondamentali nella teoria dei gruppi (Atlante di gruppi finiti), teoria dei nodi, topologia, teoria dei numeri.



Personaggi (2, 3, 4)



Sir Roger Penrose (1931-)

Fisico e matematico inglese. Contributi nel campo della relatività generale (cosmologia e buchi neri, con Stephen Hawking); filosofo; giochi matematici.

John Horton Conway (1937-)

Geniale matematico inglese. Contributi fondamentali nella teoria dei gruppi (Atlante di gruppi finiti), teoria dei nodi, topologia, teoria dei numeri.



Martin Gardner (1914-2010)

Matematico, illusionista, divulgatore scientifico americano. Curatore della rubrica "Mathematical Games" su "Scientific American". Scomparso all'età di 95 anni; il prossimo 21 ottobre compirebbe 99 anni!

GIOCHI MATEMATICI

di Martin Gardner

Una straordinaria tassellatura non periodica che arricchisce la teoria delle tassellature

Nel maggio del 1976, alla fine della seconda parte di un articolo sulla tessellatura del piano con poligoni congruenti convessi, promisi un successivo articolo sulla tessellatura non periodica. Mantengo ora la promessa e presento per la prima volta una notevole tessellatura non periodica, scoperta da Roger Penrose, un fisico matematico inglese. Dato dapprima alcune definizioni e illustrato alcuni presupposti.

Una tessellatura periodica è una tessellatura in cui si può delimitare una regione che ricopre il piano per traslazione, cioè per spostamento della regione senza rotazione né riflessione. L'artista olandese M.C. Escher è famoso per le molte tessellature periodiche così formate che rappresentano esseri viventi che compaiono nei suoi quadri. Di esse è un tipico esempio la figura in basso. L'area colorata individua una regione fondamentale.






Una successione periodica di M.C. Escher (1938).


tale che tassella il piano per traslazione. Si pensi di coprire il piano con un foglio di carta trasparente su cui siano segnati i contorni di ogni regione. Solo se la tessellatura è periodica si può spostare il foglio, senza ruotarlo, in una nuova posizione in cui tutti i contorni corrispondono ancora esattamente.

In tutti i casi conosciuti di tessellatura non periodica gli angoli congruenti, la cui somma è diversa da 360°, sono indicati nella figura a destra della illustrazione al centro nella pagina a fronte nostra come si possono mettere insieme due degli enneagoni regolari per formare un ottagono che si modifica di lungo a breve in tessellatura periodica.

Ci sono insiem di tessere di due o più forme *differenti* che diano luogo solo a tassellature non periodiche? Per esole intendiamo che né una singola forma, né un sottosistema né l'intero insieme dan-



Tessellature non periodiche con forme congruenti



Un ensanguinato (in colore a sinistra) e una coppia di emorroidi (a destra) che formano un ottimo esempio che nasconde nella storia medica.



E' una tessellatura a spirale di Heinz Voderberg

Animazione “Frecce e aquiloni nel cielo della matematica”

- Maurizio Paolini e Alessandro Musesti (2010)
- Licenza “Creative Commons”
- Fotogrammi ottenuti con POV-Ray (www.povray.org)
- Musiche di *Zero-project* (Ambient Symphony)
- Prodotto integralmente utilizzando software “opensource” su piattaforma Linux
- Durata 16 minuti
- <http://frecceaquiloni.dmf.unicatt.it/>
- Contenuta nel DVD

Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose?

Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose?

Dan Shechtman

From Wikipedia, the free encyclopedia

Dan Shechtman (Hebrew: דן שchterמן; born January 24, 1941 in Tel Aviv)^[1] is the *Philip Tobias Professor of Materials Science* at the Technion – Israel Institute of Technology, an Associate of the US Department of Energy's Ames Laboratory, and Professor of Materials Science at Iowa State University. On April 8, 1982, while on sabbatical at the U.S. National Bureau of Standards in Washington, D.C., Shechtman discovered the icosahedral phase, which opened the new field of quasiperiodic crystals.^[2] He was awarded the 2011 Nobel Prize in Chemistry for "the discovery of quasicrystals".^[3] Shechtman is the fourth Israeli to win the Nobel Prize in Chemistry in under a decade.^[4]

Contents [hide]

- 1 Biography
- 2 Academic career
- 3 Work on quasicrystals
- 4 Awards
- 5 Published works
- 6 See also
- 7 References
- 8 Further reading
- 9 External links

Biography [edit]

Dan Shechtman was born in Tel Aviv, Israel. He is married to Prof. Tzipora Shechtman, Head of the Department of Counseling and Human Development at Haifa University, and author of two books on psychotherapy.^{[5][6]} They have a son Yoav Shechtman (a PhD student in physics) and three daughters: Tamar Finkelstein (an organizational psychologist at the Israeli police leadership center), Ella Shechtman-Cory (a PhD in clinical psychology), and Ruth Dougoud-Nevo (also a PhD in clinical psychology).^{[7][8]}



Distinguished Prof. Dan Shechtman, 2011 Nobel Laureate, at Stockholm University in 2011.

Born January 24, 1941 (age 72)

Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose? (2)

Patents

Find prior art

Discuss this patent

View PDF

Download PDF

Shaving foil patterning

US 7065879 B2




ABSTRACT

The invention is directed to a shaving foil for a shaving system of a shaving apparatus, in which the shaving foil cooperates with an undercutter adapted to be driven relative to the shaving foil. The shaving foil includes a perforate region comprised of a plurality of hair-receiving apertures, wherein said apertures form a quasi-periodic pattern executed in accordance with a Penrose parquet.

Publication number US7065879 B2
Publication type Grant
Application number US 10/772,189
Publication date 27 Jun 2006
Filing date 4 Feb 2004
Priority date 9 Aug 2001
Also published as CN1272150C, 8 More »
Inventors Raoul Bader, 12 More »
Original Assignee Braun Gmbh
Patent Citations (9), Non-Patent Citations (3), Referenced by (2), Classifications (9), Legal Events (1)

External Links: [USPTO](#), [USPTO Assignment](#), [Espacenet](#)

IMAGES (5)



Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose? (2)

Patents

Find prior art

Discuss this patent

[View PDF](#)

[Download PDF](#)

Shaving foil patterning

US 7065879 B2

ABSTRACT

The invention is directed to a shaving foil for a shaving system of a shaving apparatus, in which the shaving foil cooperates with an undercutter adapted to be driven relative to the shaving foil. The shaving foil includes a perforate region comprised of a plurality of hair-receiving apertures, wherein said apertures form a quasi-periodic pattern executed in accordance with a Penrose parquet.

Publication number US7065879 B2
Publication type Grant
Application number US 10/772,189
Publication date 27 Jun 2006
Filing date 4 Feb 2004
Priority date 9 Aug 2001

Also published as [CN1272150C](#), 8 More »




Inventors [Raoul Bader](#), 12 More »

Original Assignee [Braun GmbH](#)

Patent Citations (9), Non-Patent Citations (3), Referenced by (2), Classifications (9), Legal Events (1)

External Links: [USPTO](#), [USPTO Assignment](#), [Espacenet](#)

IMAGES (5)



La **Braun** (rasoi elettrici) ha depositato un brevetto nel 2006 per una lama perforata alla maniera della tassellazione di Penrose!

Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose? (3)



Serve a qualcosa la tassellazione di Penrose? (3)



Decowall. Giuseppe Fallacara per Reneszánsz:

“Progetto sperimentale per la facciata in pietra strutturale di un complesso termale per non vedenti. Si basa sull'applicazione della famosa tassellazione di Penrose, schema di figure geometriche basate sulla sezione aurea. Essa permette di ottenere una tassellazione di superfici infinite in modo aperiodico, e consente di ottimizzare il comportamento statico della parete.”

La Tassellazione con frecce e aquiloni è **aperiodica** se

I due tasselli (la “freccia” e l’“aquilone”) sono tali che:

- ① Con essi è possibile tassellare il piano...
- ② Non è possibile farlo in modo periodico!

Si tratta quindi di verificare due fatti.

Il primo (più facile) è “costruttivo”: basta mostrare almeno un modo operativo per tassellare tutto il piano. Si usa la procedura di “deflazione” spiegata nell’animazione.

Il secondo è ben più delicato... tanto è vero che ad oggi non si conoscono tassellature aperiodiche che utilizzino un unico tassello. Si utilizza la proprietà di **inflazionabilità** di una tassellazione del piano (con frecce e aquiloni).

La Tassellazione con frecce e aquiloni è **aperiodica** se

I due tasselli (la “freccia” e l’“aquilone”) sono tali che:

- ① Con essi è possibile tassellare il piano...
- ② Non è possibile farlo in modo periodico!

Si tratta quindi di verificare due fatti.

Il primo (più facile) è “costruttivo”: basta mostrare almeno un modo operativo per tassellare tutto il piano. Si usa la procedura di “deflazione” spiegata nell’animazione.

Il secondo è ben più delicato... tanto è vero che ad oggi non si conoscono tassellature aperiodiche che utilizzino un unico tassello. Si utilizza la proprietà di **inflazionabilità** di una tassellazione del piano (con frecce e aquiloni).

La Tassellazione con frecce e aquiloni è **aperiodica** se

I due tasselli (la “freccia” e l’“aquilone”) sono tali che:

- ① Con essi è possibile tassellare il piano...
- ② Non è possibile farlo in modo periodico!

Si tratta quindi di verificare due fatti.

Il primo (più facile) è “costruttivo”: basta mostrare almeno un modo operativo per tassellare tutto il piano. Si usa la procedura di “deflazione” spiegata nell’animazione.

Il secondo è ben più delicato... tanto è vero che ad oggi non si conoscono tassellature aperiodiche che utilizzino un unico tassello. Si utilizza la proprietà di **inflazionabilità** di una tassellazione del piano (con frecce e aquiloni).

Nel 1961 Hao Wang ha dimostrato che il problema del “domino” è decidibile (cioè esiste un algoritmo per decidere se un dato insieme finito di prototasselli può tassellare il piano) se ogniqualvolta un insieme di prototasselli ammettesse una tassellazione del piano allora ne ammetterebbe anche una periodica...

Nel 1966 Robert Berger ha dimostrato che il problema del “domino” è **indecidibile**. Ne segue immediatamente che **deve esistere** un insieme di prototasselli aperiodici!

Il primo esempio (di Berger) utilizzava la bellezza di 20426 tasselli! Poi ridotti a 104, poi a 40, poi a 13 da Berger e altri e a 6 nel 1971 da Raphael Robinson.

I primi esempi di Penrose risalgono al 1973.

Curiosamente il problema analogo in 3D è più facile... ad esempio Conway ha prodotto un singolo tassello aperiodico rispetto allo spazio tridimensionale.

Nel 1961 Hao Wang ha dimostrato che il problema del “domino” è decidibile (cioè esiste un algoritmo per decidere se un dato insieme finito di prototasselli può tassellare il piano) se ogniqualvolta un insieme di prototasselli ammettesse una tassellazione del piano allora ne ammetterebbe anche una periodica...

Nel 1966 Robert Berger ha dimostrato che il problema del “domino” è **indecidibile**. Ne segue immediatamente che **deve esistere** un insieme di prototasselli aperiodici!

Il primo esempio (di Berger) utilizzava la bellezza di 20426 tasselli! Poi ridotti a 104, poi a 40, poi a 13 da Berger e altri e a 6 nel 1971 da Raphael Robinson.

I primi esempi di Penrose risalgono al 1973.

Curiosamente il problema analogo in 3D è più facile... ad esempio Conway ha prodotto un singolo tassello aperiodico rispetto allo spazio tridimensionale.

Nel 1961 Hao Wang ha dimostrato che il problema del “domino” è decidibile (cioè esiste un algoritmo per decidere se un dato insieme finito di prototasselli può tassellare il piano) se ogniqualvolta un insieme di prototasselli ammettesse una tassellazione del piano allora ne ammetterebbe anche una periodica...

Nel 1966 Robert Berger ha dimostrato che il problema del “domino” è **indecidibile**. Ne segue immediatamente che **deve esistere** un insieme di prototasselli aperiodici!

Il primo esempio (di Berger) utilizzava la bellezza di 20426 tasselli! Poi ridotti a 104, poi a 40, poi a 13 da Berger e altri e a 6 nel 1971 da Raphael Robinson.

I primi esempi di Penrose risalgono al 1973.

Curiosamente il problema analogo in 3D è più facile... ad esempio Conway ha prodotto un singolo tassello aperiodico rispetto allo spazio tridimensionale.

Nel 1961 Hao Wang ha dimostrato che il problema del “domino” è decidibile (cioè esiste un algoritmo per decidere se un dato insieme finito di prototasselli può tassellare il piano) se ognqualvolta un insieme di prototasselli ammettesse una tassellazione del piano allora ne ammetterebbe anche una periodica...

Nel 1966 Robert Berger ha dimostrato che il problema del “domino” è **indecidibile**. Ne segue immediatamente che **deve esistere** un insieme di prototasselli aperiodici!

Il primo esempio (di Berger) utilizzava la bellezza di 20426 tasselli! Poi ridotti a 104, poi a 40, poi a 13 da Berger e altri e a 6 nel 1971 da Raphael Robinson.

I primi esempi di Penrose risalgono al 1973.

Curiosamente il problema analogo in 3D è più facile... ad esempio Conway ha prodotto un singolo tassello aperiodico rispetto allo spazio tridimensionale.

Deflazione - Personaggi (5)

Per dimostrare che con **aquiloni** e **frecce** è possibile piastrellare l'intero piano utilizziamo la cosiddetta procedura di **deflazione**. L'idea è di suddividere i due tasselli con copie più piccole di loro stessi.

Illustriamo il procedimento con una analogia monodimensionale, la famosa **stringa dei conigli di Fibonacci**:

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...



Leonardo Fibonacci, Pisa, 1170ca. – Pisa, 1240ca., famosissimo matematico italiano, autore del “Liber abbaci” e ideatore della successione che da lui prende il nome.

Deflazione - Personaggi (5)

Per dimostrare che con **aquiloni** e **frecce** è possibile piastrellare l'intero piano utilizziamo la cosiddetta procedura di **deflazione**. L'idea è di suddividere i due tasselli con copie più piccole di loro stessi.

Illustriamo il procedimento con una analogia monodimensionale, la famosa **stringa dei conigli di Fibonacci**:



1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...



Leonardo Fibonacci, Pisa, 1170ca. – Pisa, 1240ca., famosissimo matematico italiano, autore del “Liber abbaci” e ideatore della successione che da lui prende il nome.

Deflazione (2)

Vi ricordate? Fibonacci considerava conigli immaginari che possono essere piccoli o grandi, un coniglio piccolo diventa grande e un coniglio grande rimane grande e genera un nuovo coniglio piccolo:



L'idea è di applicare due semplici regole di sostituzione per trasformare una sequenza di 0 e 1 (zero e uno, coniglio piccolo e coniglio grande) e passare da una *generazione* alla successiva.


Le due regole sono:

$$0 \Rightarrow 1$$

$$1 \Rightarrow 1\ 0$$

Deflazione (2)

Vi ricordate? Fibonacci considerava conigli immaginari che possono essere piccoli o grandi, un coniglio piccolo diventa grande e un coniglio grande rimane grande e genera un nuovo coniglio piccolo:



L'idea è di applicare due semplici regole di sostituzione per trasformare una sequenza di 0 e 1 (zero e uno, coniglio piccolo e coniglio grande) e passare da una *generazione* alla successiva.

Le due regole sono:

$$0 \Rightarrow 1$$

$$1 \Rightarrow 1\ 0$$

Deflazione (3)

Applichiamo le due regole alla lettera a partire dalla stringa “1” per sei generazioni:

1 → 10 → 101 → 10110 → 10110101 → 1011010110110

Nota

Ogni nuova stringa inizia con la stringa precedente! Questo è un fatto **importantissimo** e per nulla ovvio. In particolare si può “passare al limite” e ottenere una stringa infinita.

Nota 2

Ad ogni passaggio si inseriscono nuovi caratteri che devono “farsi posto” nella stringa spostando verso destra i caratteri successivi.

Deflazione (3)

Applichiamo le due regole alla lettera a partire dalla stringa “1” per sei generazioni:

$$1 \rightarrow 10 \rightarrow 101 \rightarrow 10110 \rightarrow 10110101 \rightarrow 1011010110110$$

Nota

Ogni nuova stringa inizia con la stringa precedente! Questo è un fatto **importantissimo** e per nulla ovvio. In particolare si può “passare al limite” e ottenere una stringa infinita.

Nota 2

Ad ogni passaggio si inseriscono nuovi caratteri che devono “farsi posto” nella stringa spostando verso destra i caratteri successivi.

Deflazione (3)

Applichiamo le due regole alla lettera a partire dalla stringa “1” per sei generazioni:

$$1 \rightarrow 10 \rightarrow 101 \rightarrow 10110 \rightarrow 10110101 \rightarrow 1011010110110$$

Nota

Ogni nuova stringa inizia con la stringa precedente! Questo è un fatto **importantissimo** e per nulla ovvio. In particolare si può “passare al limite” e ottenere una stringa infinita.

Nota 2

Ad ogni passaggio si inseriscono nuovi caratteri che devono “farsi posto” nella stringa spostando verso destra i caratteri successivi.

Deflazione (4)

Usiamo segmenti allineati (bianchi e neri) al posto dei caratteri 0 e 1. Questo ci permette (accorciando i segmenti quando serve) di evitare lo spostamento verso destra:

Deflazione (4)

Usiamo segmenti allineati (bianchi e neri) al posto dei caratteri 0 e 1. Questo ci permette (accorciando i segmenti quando serve) di evitare lo spostamento verso destra:



Ma così otteniamo segmenti di varia lunghezza...

Deflazione (5)

Si può ovviare decidendo che i segmenti neri (conigli grandi) siano un po' più lunghi dei segmenti bianchi. Il rapporto giusto è (indovinate...):

Deflazione (5)

Si può ovviare decidendo che i segmenti neri (conigli grandi) siano un po' più lunghi dei segmenti bianchi. Il rapporto giusto è (indovinate...):

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180\dots$$

Deflazione (5)

Si può ovviare decidendo che i segmenti neri (conigli grandi) siano un po' più lunghi dei segmenti bianchi. Il rapporto giusto è (indovinate...):

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180\dots$$



Ovvero: ricopriamo i tasselli (segmenti bianchi, più corti, e segmenti neri, un po' più lunghi) con copie più piccole degli stessi.

Deflazione (6)

Se poi dilatiamo di un fattore ϕ il risultato di una nuova generazione, i segmenti bianchi e neri mantengono la loro dimensione originale.


L'unione di tutti i segmenti diventa ora sempre più grande fino ad invadere una intera semiretta (manteniamo l'allineamento a sinistra in modo da sfruttare il fatto che la stringa di '0' e '1' di Fibonacci alla nuova generazione 'prolunga' la generazione precedente.)

Deflazione (6)

Se poi dilatiamo di un fattore ϕ il risultato di una nuova generazione, i segmenti bianchi e neri mantengono la loro dimensione originale.

L'unione di tutti i segmenti diventa ora sempre più grande fino ad invadere una intera semiretta (manteniamo l'allineamento a sinistra in modo da sfruttare il fatto che la stringa di '0' e '1' di Fibonacci alla nuova generazione 'prolunga' la generazione precedente.)

Ora l'analogia è perfetta con i triangoli aurei acuti e ottusi (mezzo aquilone e mezza freccia) ricoperti con copie più piccole degli stessi:




Conclusione

con successive “deflazioni” e dilatazioni otteniamo una tassellazione di una regione sempre più ampia; si scopre che ogni 4 generazioni la tassellazione consiste in una “estensione” di quella vecchia, permettendo un “passaggio al limite”.

Alla fine si ottiene una tassellazione di tutto il piano,
nell’animazione si ottiene il cosiddetto “sun pattern” o lo “star pattern”, partendo da un decagono formato da 5 aquiloni.

Quindi “freccia” e “aquilone” possono tassellare il piano!

Quasi-cristalli e quasi-periodicità



1 : verso destra


0 : verso l'alto

$$m = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \phi - 1 = \frac{1}{\phi}$$

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...

(Si, è ancora lei, la stringa dei conigli di Fibonacci!)

Quasi-cristalli e quasi-periodicità



1 : verso destra

0 : verso l'alto

$$m = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \phi - 1 = \frac{1}{\phi}$$

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...

(Si, è ancora lei, la stringa dei conigli di Fibonacci!)

Frecce e aquiloni:

Piano opportuno dentro un reticolo cubico in dimensione 5

Richiamo

1 ...

2 Non è possibile farlo in modo periodico!

Richiamo

1 ...

2 Non è possibile farlo in modo periodico!


L'ingrediente fondamentale per dimostrarlo è la possibilità di fare il **contrario della deflazione (inflazione)**, ovvero ricostruire una tassellazione con tasselli più grossi.

Richiamo

- 1 ...
- 2 Non è possibile farlo in modo periodico!

L'ingrediente fondamentale per dimostrarlo è la possibilità di fare il **contrario della deflazione (inflazione)**, ovvero ricostruire una tassellazione con tasselli più grossi.

Che questo sia possibile è ovvio per la tassellazione costruita per **deflazione**, ma non lo è per nulla per una generica tassellazione!



Chiamiamo **Universo di Penrose** una tassellazione del piano con frecce e aquiloni.

Conway ha scoperto proprietà veramente sorprendenti sugli universi di Penrose, eccone alcune:

Chiamiamo **Universo di Penrose** una tassellazione del piano con frecce e aquiloni.

Conway ha scoperto proprietà veramente sorprendenti sugli universi di Penrose, eccone alcune:

- C'è una quantità più che numerabile di **universi di Penrose** diversi

Chiamiamo **Universo di Penrose** una tassellazione del piano con frecce e aquiloni.

Conway ha scoperto proprietà veramente sorprendenti sugli universi di Penrose, eccone alcune:

- C'è una quantità più che numerabile di **universi di Penrose** diversi
- Ogni regione limitata di un universo di Penrose si ritrova identica in un qualunque altro universo di Penrose; inoltre per trovarla è sufficientemente percorrere una distanza $2d$, dove d è il diametro della regione di partenza

Chiamiamo **Universo di Penrose** una tassellazione del piano con frecce e aquiloni.

Conway ha scoperto proprietà veramente sorprendenti sugli universi di Penrose, eccone alcune:

- C'è una quantità più che numerabile di **universi di Penrose** diversi
- Ogni regione limitata di un universo di Penrose si ritrova identica in un qualunque altro universo di Penrose; inoltre per trovarla è sufficientemente percorrere una distanza $2d$, dove d è il diametro della regione di partenza
- Se si rimuove un numero finito di tasselli da un universo di Penrose, non c'è altro modo di "riempire il buco" se non quello iniziale


Chiamiamo **Universo di Penrose** una tassellazione del piano con frecce e aquiloni.

Conway ha scoperto proprietà veramente sorprendenti sugli universi di Penrose, eccone alcune:

- C'è una quantità più che numerabile di **universi di Penrose** diversi
- Ogni regione limitata di un universo di Penrose si ritrova identica in un qualunque altro universo di Penrose; inoltre per trovarla è sufficientemente percorrere una distanza $2d$, dove d è il diametro della regione di partenza
- Se si rimuove un numero finito di tasselli da un universo di Penrose, non c'è altro modo di "riempire il buco" se non quello iniziale


Nota: proprietà quasi identiche valgono anche per gli **Universi (monodimensionali) di Fibonacci**

Ruote di carro, Galli e pipistrelli...



Ecco la struttura (infinita) che Conway ha battezzato “**cartwheel**”, letteralmente “ruota di carro”. Si distingue un “**batman**” (pipistrello) al centro formato da 5 frecce e 5 aquiloni; un decagono bianco che lo circonda; dieci “**worms**” (vermi) che formano i raggi della ruota.

Ruote di carro, Galli e pipistrelli...




Ecco la struttura (infinita) che Conway ha battezzato “**cartwheel**”, letteralmente “ruota di carro”. Si distingue un “**batman**” (pipistrello) al centro formato da 5 frecce e 5 aquiloni; un decagono bianco che lo circonda; dieci “**worms**” (vermi) che formano i raggi della ruota.

I lati del decagono sono divisi secondo la sezione aurea e delimitano una corona (regione bianca nel disegno) formata da dieci *ace*, come Conway chiama la struttura a forma di aquilone più grande fatta da due aquiloni e una freccia.

I “vermi” sono formati da una sequenza di “**bow ties**” (farfallini/papillons) lunghi e corti.


Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (2)

Il cartwheel si ottiene per deflazione a partire da due mezzi aquiloni (triangoli aurei acuti)



Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (2)

Il cartwheel si ottiene per deflazione a partire da due mezzi aquiloni (triangoli aurei acuti)



Animazione “Da Batman ad Asterix e i 62 decapodi”

- M. Paolini (gennaio 2011)
- Musiche di *Zero-project* (Ambient Symphony)
- Contenuta negli extra del DVD

Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (2)

La regione esterna al decagono ha a prima vista una simmetria decagonale; questo è vero solo se si rimuovono anche i “vermi” ...

Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (2)

La regione esterna al decagono ha a prima vista una simmetria decagonale; questo è vero solo se si rimuovono anche i “vermi” ...


Una volta rimosso il “batman” centrale è possibile rovesciare uno o più vermi (ruotando di conseguenza anche il corrispondente “ace” (“asso”, struttura con una freccia e due aquiloni a forma di aquilone più grande) interno al decagono.

Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (2)

La regione esterna al decagono ha a prima vista una simmetria decagonale; questo è vero solo se si rimuovono anche i “vermi” ...

Una volta rimosso il “batman” centrale è possibile rovesciare uno o più vermi (ruotando di conseguenza anche il corrispondente “ace” (“asso”, struttura con una freccia e due aquiloni a forma di aquilone più grande) interno al decagono.

Questo modifica la forma del buco centrale dove si trovava il “batman”; le possibili forme che si ottengono (sono 62 a meno di simmetrie) sono state chiamate “**decapodi**” da Conway, uno di questi è il “batman” stesso, un altro è “**Asterix**” (il Gallo)



Ruote di carro, Galli e pipistrelli... (3)

- Con l'eccezione di “*batman*” nessun decapodo è tassellabile

- Con l'eccezione di “*batman*” nessun decapodo è tassellabile
- Con l'eccezione di “*batman*” e “*asterix*” l'esterno di un decapodo è tassellabile in modo unico

- Con l'eccezione di “*batman*” nessun decapodo è tassellabile
- Con l'eccezione di “*batman*” e “*asterix*” l'esterno di un decapodo è tassellabile in modo unico
- Un decapodo può essere interpretato come fosse una **dislocazione** in un reticolo cristallino: può essere riposizionato (ricollocando un numero finito di tasselli), ma non può essere eliminato

- Con l'eccezione di “*batman*” nessun decapodo è tassellabile
- Con l'eccezione di “*batman*” e “*asterix*” l'esterno di un decapodo è tassellabile in modo unico
- Un decapodo può essere interpretato come fosse una **dislocazione** in un reticolo cristallino: può essere riposizionato (ricollocando un numero finito di tasselli), ma non può essere eliminato
- I 61 decapodi (escludendo *batman*) sono essenzialmente gli unici tipi di “*buchi*” in una tassellazione di quasi tutto il piano (nel 1975 questa era una congettura, non so se poi è stata dimostrata)

La sorpresa finale...

Com'è fatto un "verme" della ruota del carro?

Se indichiamo con un **1** un papillon lungo e con uno **0** un papillon corto, la successione dei papillon che formano l'intero raggio della ruota corrisponde a...

La sorpresa finale...

Com'è fatto un "verme" della ruota del carro?

Se indichiamo con un **1** un papillon lungo e con uno **0** un papillon corto, la successione dei papillon che formano l'intero raggio della ruota corrisponde a...

1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...

Di nuovo la stringa dei conigli di Fibonacci!

Bibliografia - Sitografia

- ① B. Grünbaum G.C. Shephard, Tiling and Patterns, W.H. Freeman, New York, 1987.
- ② M. Senechal, Quasicrystals and geometry, Cambridge University Press, 1995.
- ③ R. Penrose, The role of aesthetics in pure and applied mathematical research, Bull. Inst. of Math. and its Appl. 10, 1974.
- ④ D. Schattschneider, Visioni della simmetria. I disegni periodici di M. C. Escher, Edizioni Zanichelli, 1992.
- ⑤ M. Gardner, Extraordinary nonperiodic tiling that enriches the theory of tiles, rubrica "Mathematical Games" di Scientific american, 1975(?), tradotto su Le Scienze, 1977(?).


-
- ① <http://frecceaquiloni.dmf.unicatt.it/> - immagine "iso" del DVD.
 - ② <http://www.robertoginti.it/> - Animazioni Rep-Tiles.
 - ③ <http://danzer.dmf.unicatt.it/> - Tassellazione aperiodica dello spazio.
-

Grazie per l'attenzione!

Supponiamo che le lunghezze dei lati dei tasselli siano 1 e $\phi = 1,6180\dots$

- Costruire un decagono di lato 1
- Costruire un decagono di lato ϕ
- Costruire un decagono di lato $1 + \phi$ (dentro ci sarà un batman)

Si può estendere una coppia di papillon piccoli affiancati in una tassellazione di tutto il piano?



E una terna di papillon grandi?

